

# ИЗУЧЕНИЕ ИММУНОТРОПНОСТИ ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОДОРАСТВОРIMЫХ АНТИОКСИДАНТОВ *IN VITRO*

Клепикова С.Ю.<sup>1</sup>, Колесникова О.П.<sup>2</sup>, Просенко А.Е.<sup>3</sup>,  
Кандалинцева Н.В.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> ГОУ ВПО «Новосибирский государственный медицинский университет Федерального агентства

по здравоохранению и социальному развитию», г. Новосибирск

<sup>2</sup> ГУ НИИ клинической иммунологии СО РАМН, г. Новосибирск

<sup>3</sup> НИИ химии антиоксидантов НГПУ, г. Новосибирск

**Резюме.** Проведено исследование иммунотропных свойств соединений  $\omega$ -(3,5-ди-метил-4-гидроксифенил)пропилтиосульфонат натрия (Ф-11-7) и  $\omega$ -(3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксифенил)пропилтиосульфонат натрия (Ф-17-7) на спонтанную и митоген-стимулированную пролиферацию клеток селезенки в культуре *in vitro*. Обнаружено, что соединения Ф-11-7 и Ф-17-7 дозозависимо подавляют пролиферацию интактных спленоцитов.

**Ключевые слова:** водорастворимые антиоксиданты, иммунотропные препараты.

Klepikova S.Yu., Kolesnikova O.P., Prossenko A.Ye., Kandalintceva N.V.

## *IN VITRO* IMMUNOTROPICITY STUDIES OF POLYFUNCTIONAL WATER-SOLUBLE ANTIOXIDANTS

**Abstract.** A study of immunotropie properties of  $\omega$ -(3,5-dimethyl-4-hydroxyphenyl) propylthiosulfonate, sodium salt (F-11-7), and  $\omega$ -(3,5-di-tret-butyl-4-hydroxyphenyl) propylthiosulfonate, sodium salt (F-17-7) was carried out, employing an *in vitro* model of spontaneous and mitogen-stimulated proliferation of cultured spleen cells. It is revealed, that the F-11-7 and F-17-7 compounds are able to suppress proliferation of intact splenocytes in a dose-dependent manner. (*Med. Immunol.*, 2008, vol. 10, N 2-3, pp 269-272)

## Введение

В настоящее время активированные кислородные метаболиты (АКМ) и окислительные реакции с их участием рассматриваются как универсальный механизм регуляции клеточной пролиферации и апоптоза, в том числе в клетках иммунной системы [2]. Актуальной проблемой является поиск иммуноактивных соединений с относительно селективным механизмом действия, который сдерживается отсутствием адекватных моделей. Аналогичные проблемы существуют для изучения антиоксидантных свойств препаратов [3]. В единичных работах предпринимаются шаги для разработки системы оценки иммунотропных пре-

паратов на основе анализа взаимосвязи иммунной и антиоксидантной систем [6]. Нами ранее в модельных системах тестирования, основанных на окислении этилолеата в водно-эмulsionционной среде, образования малонового диальдегида при инкубации выделенных липопротеинов низкой плотности с ионами металлов переменной валентности и дыхательном «взрыве» гранулоцитов, стимулированном зимозаном, показана высокая антиокислительная активность соединений Ф-17-7 и Ф-11-7 [5]. Данные соединения представляют собой новые водорастворимые антиоксиданты, содержащие в своей структуре два активных фрагмента – стерически затрудненный фенольный и тиосульфонатный [4].

Целью настоящей работы является исследование иммуноактивных свойств соединений в тестах спонтанной и митоген-стимулированной пролиферации клеток селезенки в культуре *in vitro*.

## Адрес для переписки:

Клепикова Софья Юрьевна  
630064, г. Новосибирск, пр. Карла Маркса, 14, к. 37.  
Tel.: 8 (913) 904-15-78.  
E-mail: klepikova.sofya@mail.ru

## Материалы и методы

В работе использовали здоровых половозрелых животных – самцов мышей гибридов (CBAxC57BL/6)F1 (CBF1), 8–10 недельного возраста, массой тела 18–20 г, полученных из питомника («Рассвет», г. Томск). Животные содержались в виварии в одинаковых условиях: в стандартных пластиковых клетках с мелкой древесной стружкой (не более 10 особей), на стандартном рационе, при естественном освещении. Клетки селезенки мышей CBF1 культивировали в круглодонных планшетах для иммунологических реакций («Linbro») при +37°C в атмосфере 5% CO<sub>2</sub> и 95% воздуха. Абсолютное количество клеток, вносимых в лунку, составляло 200 000. Клетки стимулировали митогенами конканавалином A (ConA, «Sigma») или митогеном лаконоса (PWM, «Sigma»). Концентрации митогенов подбирали предварительным титрованием и использовали в оптимальной дозе, что составило для ConA 2 мкг/мл, а для PWM 1 мкг/мл. Соединения Ф-11-7 и Ф-11-7 в трех дозах вносили в лунки одновременно с митогенами. Пролиферативную активность клеток оценивали по включению Н3-тимидина в ДНК делящихся клеток. Метку вносили за 16 часов до конца культивирования по 1 мКи в каждую лунку планшета. По окончании инкубации клетки собирали на стеклянно-волокнистые фильтры («Flow Lab») с помощью аппарата Harvester («Titertek»). Радиоактивность подсчитывали в жидкостном сцинтилляционном счетчике «Delta» (США).

## Результаты и обсуждение

Важную роль в развитии иммunosупрессии играет усиление свободнорадикальных реакций и процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ) клеточных мембран. Активация ПОЛ приводит к изменению структуры их двойного фосфолипидного слоя, конформации и взаимного расположения мембранных рецепторов, нарушению функций транспортных и канальных белков, инактивации мембраносвязанных ферментов. АКМ, являясь продуктами ПОЛ, дезорганизуют структуру мембран различных клеток, в первую очередь гепатоцитов, эритроцитов и иммunoцитов [7]. Образование и расходование АКМ находится под контролем многоступенчатой антиоксидантной системы, а сами антиоксиданты являются универсальными мембраностабилизаторами. Развителенная сеть антиоксидантов препятствует каскадному радикалообразованию в иммунокомпетентных клетках. При этом функциональные возможности иммунокомпетентных клеток определяются их внутриклеточными метаболическими процессами, среди которых ключевую роль играют процессы свободнорадикального окисления и образования АКМ [2].




Рисунок 1. Влияние водорастворимых антиоксидантов Ф-11-7 и Ф-17-7 на спонтанную и митоген-стимулированную пролиферацию клеток селезени *in vitro*

Нами ранее показано, что добавление в культуру мононуклеарных клеток (МНК) периферической крови больных хроническим гепатитом С (ХГС) соединения Ф-17-7 в дозе 0,2 мкг/мл приводило к усилению пролиферативной активности МНК у 75% больных ХГС [8].

Возможность иммунотропных препаратов регулировать пролиферативную активность иммунокомпетентных клеток исследовали в присутствии соединений Ф-17-7, Ф-11-7 в дозах 2 мкг/мл, 20 мкг/мл и 200 мкг/мл на спонтанную и стимулированную митогенами ConA, PWM, LPS пролиферацию Т- и В- клеток селезени интактных мышей. Полученные результаты представлены на рисунке 1.

Установили, что соединение Ф-11-7 в дозе 20 мкг/мл дозозависимо подавляет спонтанную пролиферацию на 47%, а ConA, PWM и LPS-стимулированную пролиферацию клеток селезени соответственно на 43%, 45% и 39%, а в дозе 200 мкг/мл – спонтанную на 58%, ConA – на 75%, PWM – на 72% и LPS – на 69%.

Соединение Ф-17-7 в двух дозах подавляет спонтанную пролиферацию соответственно на 62% и 80%. В дозе 20 мкг/мл ингибция митоген-индуцированной пролиферации равна: ConA – на 55%, PWM – на 53%, LPS – на 56%. При этом подавление ConA, PWM и LPS-стимулированной пролиферации клеток селезени в дозе 200 мкг/мл сводится практически до нуля.

Низкие дозы соединений Ф-11-7 и Ф-17-7, по всей видимости, угнетают функциональную активность иммунокомпетентных клеток, снижая их способность адекватно отвечать на стимуляцию митогеном. Так, соединения Ф-11-7 и Ф-17-7 в дозе 2 мкг/мл не проявляют значи-




Рисунок 2. Влияние водорастворимых антиоксидантов Ф-11-7 и Ф-17-7 на спонтанную и митоген-стимулированную пролиферацию клеток селезенки *in vitro*

тельного эффекта на ингибцию спонтанной и митоген-индуцированной пролиферации.

При обследовании крови больных ревматоидным артритом было обнаружено, что соединения Ф-11-7 и Ф-17-7 в дозе 200 мкг/мл резко подавляли спонтанную и митоген-стимулированную пролиферацию лимфоцитов периферической крови. Соединение Ф-11-7 ингибировало спонтанную – на 77%, ConA – на 96%, PWM – на 57%, соединение Ф-17-7 соответственно спонтанную – на 91%, ConA – на 98%, PWM – на 98%. Полученные результаты совпадают с данными предыдущих опытов, проведенных на клетках селезенки интактных мышей *in vitro*.

Подавление Т- и В-клеточной пролиферации возможно связано с удалением супероксидного радикала из среды культивирования водорастворимыми антиоксидантами Ф-11-7 и Ф-17-7. Известно [1], что удаление супероксидного радикала из среды культивирования с помощью СОД приводит к снижению уровня стимулированной ConA пролиферации мононуклеарных клеток периферической крови человека и спленоцитов мышей [1]. Можно предположить, что исследуемые антиоксиданты действуют подобно СОД.

Таким образом, нами выявлено ингибирующее влияние соединений Ф-11-7 и Ф-17-7 в дозах 20 мкг/мл и 200 мкг/мл на пролиферативную активность иммунокомпетентных клеток *in vitro* и в дозе 200 мкг/мл на пролиферацию лимфоцитов периферической крови человека, больного ревматоидным артритом.

Данные об иммуноактивных свойствах *in vitro* и *in vivo* антиоксидантов многочисленны и достаточно противоречивы. По данным [10], лимфоциты крови, инкубированные *in vitro* с  $1 \times 10^{-9}$  М  $\beta$ -каротина и стимулированные ConA, проявляли усиление пролиферации, а по данным [13],  $\beta$ -каротин в дозе от  $1 \times 10^{-6}$  до  $1 \times 10^{-5}$  М – ин-

гибирал пролиферацию лимфоцитов *in vitro*. Стимуляторная активность  $\beta$ -каротина на лимфоцитарный бластогенез показана на разных видах животных. В/м введение от 20 до 40 мг  $\beta$ -каротина зеленым [11] и новорожденным морским свинкам усиливает пролиферацию лимфоцитов крови. Аналогично, увеличение ConA- и LPS-индукционной пролиферации лимфоцитов наблюдали у крыс, содержащихся на диете с 2% содержанием  $\beta$ -каротина по весу и аналогом  $\beta$ -каротина [9]. В то же время показано, что ресвератрол дозозависимо подавляет ConA и LPS-индукционную пролиферацию спленоцитов [12], но в низких дозах (0,75-6 мкмоль/л) приводит к ее усилению [14].

## Список литературы

- Вольский Н.Н., Кашлакова Н.В., Козлов В.А. Влияние супероксидного радикала на пролиферацию лимфоцитов, стимулированную митогеном // Цитология. – 1988. – № 7. – С. 899-901.
- Зенков Н.К., Ланкин В.З., Меньшикова Е.Б. Оксидантный стресс. – М.: Наука, 2001. – 315 с.
- Зенков Н.К., Кандалинцева Н.В., Ланкин В.З., Меньшикова Е.Б., Просенко А.Е. Фенольные биоантисиданты. – Новосибирск: СО РАН, 2003. – С. 7-11.
- Кандалинцева Н.В., Дюбченко О.И., Клепикова С.Ю., Терех Е.И., Просенко А.Е. Синтез полифункциональных водорастворимых антиоксидантов на основе  $\omega$ -(4-оксиарил) галогеналканов // Тез. докл. III Международной конф. «Современные проблемы органической химии». – Новосибирск: СО РАН, 2001. – С. 95.
- Просенко А.Е., Клепикова С.Ю., Кандалинцева Н.В., Дюбченко О.И., Зенков Н.К. Синтез и исследование антиоксидантных свойств новых водорастворимых серосодержащих фенольных соединений // Бюллетень СО РАН. – 2001. – № 1. – С. 114-119.
- Тутельян А.В. Разработка системы оценки иммунотропных препаратов природного и синтетического происхождения на основе анализа взаимосвязи иммунной и антиоксидантной защиты // Аллергология и иммунология. – 2004. – Т. 5, № 2. – С. 289-299.
- Утешев Б.С., Быстрова Н.А., Бровкина И.Л., Авакян А.Р. Иммуномодулирующее и антиоксидантное действие витаминов А и Е при воздушном и иммерсионном охлаждении // Экспериментальная и клиническая фармакология. – 2001. – Т. 64, № 1. – С. 60-63.
- Фридлянд И.Ф., Просенко А.Е., Клепикова С.Ю., Кандалинцева Н.В., Леплина О.Ю., Тихонова М.А., Останин А.А., Черных Е.Р. Влияние антиоксидантов на функциональную активность

- мононуклеарных клеток периферической крови больных вирусным гепатитом С // Мед. иммунология. – 2001. – Т. 3, № 2. – С. 243.
9. Bendich A., Shapiro S.S. Effect of  $\beta$ -carotene and canthaxanthin on the immune responses of the rat // J. Nutr. – 1986. – N 11. – P. 2254-2262.
  10. Daniel L.R., Chew B.P., Tanaka T.S., Tjoelker L.W. In vitro effects of  $\beta$ -carotene and vitamin A on peripheral blood mononuclear cell proliferation // J. Dairy Sci. – 1990. – N 3. – P. 74-911.
  11. Hoskinson C.D., Chew B.P., Wong T.S. Effects of  $\beta$ -carotene (BC) and vitamin A (VA) on mitogen-induced lymphocyte proliferation in the pig in vivo // Fed. Am. SOC. Exp. Biol. J. – 1989. – N 3. – P. 663.
  12. Sharma S., Chopra K., Kulkarni S.K., Agrewala J.N. Resveratrol and curcumin suppress immune response through CD28/CTLA-4 and CD80 co-stimulatory pathway // Clin. Exp. Immunol. – 2006. – N 5. – P. 147, 155-163.
  13. Tjoelker L.W., Chew B.P., Tanaka T.S., Danie L.R. Bovine vitamin A and  $\beta$ -carotene intake and lactational status. Responsiveness of mitogen-stimulated peripheral blood lymphocytes to vitamin A and  $\beta$ -carotene challenge in vitro // J. Dairy Sci. – 1988. – N 1. – P. 71, 3120-3127.
  14. Wen-Liang Z., Wu Qing-Li, LI Xiao-Yu, Wei-Min Z., Zou Jian-Ping. Low dose of resveratrol enhances immune response of mice // Acta Pharmacol. Sin. – 2002. – N 10. – P. 893-897.

поступила в редакцию 25.05.2007

отправлена на доработку 10.06.2007

принята к печати 04.02.2008